

Fecha de obtención del CI: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____

Paciente: _____ Rut: _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut: _____

La "Cirugía Mayor Ambulatoria" (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas

Objetivo

El chalazión es una inflamación quística de las glándulas del borde palpebral, por obstrucción de sus conductos de salida. Su contenido es material sebáceo producido por la propia glándula. Se presenta como un nódulo en el borde del párpado que inicialmente está inflamado y puede drenar espontáneamente hacia la conjuntiva o por la piel. Cuando su evolución espontánea no se produce, requiere de drenaje quirúrgico.

Características

En pacientes adultos se realiza con anestesia local, en niños se requiere de anestesia general. Se realiza una incisión vía conjuntival o eventualmente vía externa (por piel) y se vacía el contenido, dejando que cicatrice espontáneamente. Se mantiene parche compresivo por 24 horas. El chalazión puede volver a aparecer en la glándula vecina o en el párpado contra lateral.

Riesgos

Entre los riesgos se describen:

- Hemorragias del párpado
- Erosión corneal

Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de **CHALAZION**.

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal

