

Fecha de obtención del CI: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____

Paciente: _____ Rut: _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut: _____

Objetivo

Causar la reducción selectiva y temporal de la contracción en la musculatura hiperactiva durante un período medio de 12,5 semanas mediante la acción selectiva en las terminaciones nerviosas colinérgicas periféricas.

Características

Consiste en la inyección de toxina botulínica A en aquellas áreas donde se pretende obtener su efecto. Las indicaciones principales del tratamiento son:

- Asimetría y arrugas faciales causadas por la hiperactividad muscular en la zona frontal, periorbitaria, peribucal y cervical.
- Hiperhidrosis o exceso de sudoración en axilas y manos.

Normalmente el tratamiento con toxina botulínica tipo A no precisa anestesia, pero en determinadas circunstancias puede requerirse. Es necesario que, previo al procedimiento, advierta de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

Riesgos

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación actual del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad).

Específicos del procedimiento:

Poco frecuentes y no graves: Ptosis (caída) del párpado superior uni o bilateral, diplopía y hematomas en sitio de punción. Todos los efectos son reversibles, aunque algunos pueden demorar meses en revertir.

Poco frecuentes y poco graves: Infección, cambios en la sensibilidad cutánea, reacciones alérgicas, asimetría de la zona tratada, sequedad de manos y axilas por hipofuncionalidad temporal de los anexos cutáneos y glándulas sudoríparas, dolor en sitio de inyección. En algunos casos puede ser necesario volver a inyectar, a corto plazo, para corregir asimetrías inducidas por el tratamiento.

Graves y muy poco frecuentes: Trastornos de la deglución y trastornos del habla o de la respiración.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven en forma espontánea, pero pueden llegar a requerir una intervención. Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo la mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

Se me ha facilitado esta hoja informativa, habiendo comprendido el significado del procedimiento y los riesgos inherentes al mismo y declaro estar debidamente informado/a, habiendo tenido oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con doctor(a) Asimismo, he recibido respuesta a todas mis preguntas, habiendo tomado la decisión de manera libre y voluntaria.

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal