

Fecha de obtención del CI: \_\_\_\_\_

Diagnóstico: \_\_\_\_\_

Médico (Primer nombre y dos apellidos): \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_

Paciente (Primer nombre y dos apellidos): \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_

Representante legal (si corresponde): \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_

### Objetivo

El tratamiento con Abatacept pretende aliviar los síntomas y frenar la progresión de la artritis reumatoide.

### Características

El Abatacept (ORENCIA®) es un fármaco biológico que modula selectivamente el proceso de activación de los linfocitos T, un tipo de leucocito que juega un papel muy importante en la artritis reumatoide. Actualmente se sabe que la modulación de la actividad de estas células puede reducir la inflamación y el dolor de sus articulaciones.

El tratamiento se administra por vía intravenosa mensual (cuya dosis dependerá de su peso) o vía subcutánea semanal (a una dosis fija), aunque esta periodicidad puede ser modificada por su médico.

En el caso de usarlo vía subcutánea su reumatólogo o la enfermera le explicarán cómo administrarse el medicamento en casa. En algunos casos puede que necesite acudir a este Centro Médico para que se le administre el medicamento.

Antes de iniciar el tratamiento se le practicará una evaluación que consiste en: una historia médica completa, exploración física, análisis de sangre y orina, serología VHB y VHC, quantiferon, radiografía de tórax y test de embarazo a las mujeres en edad fértil.

Mientras reciba el tratamiento su reumatólogo le hará un seguimiento periódico en la consulta donde se le practicará: una entrevista para conocer los síntomas de su enfermedad, una exploración física general y de sus articulaciones, un análisis de sangre y orina y además, se le solicitará información sobre los fármacos que está tomando y de cualquier molestia que experimente en relación con ellos.

El tratamiento es continuado mientras que la actividad de la enfermedad lo requiera, y siempre que no se detecten efectos secundarios.

### Riesgos

En el sitio de administración subcutánea puede presentar una reacción leve incluyendo escozor, enrojecimiento, hinchazón o dolor, generalmente transitoria y que ceden con medidas simples que su tratante le indicará. Después de la administración se pueden presentar reacciones adversas como: dolor de cabeza, náuseas, elevación de la presión arterial o dificultad respiratoria.

Puede sufrir infecciones con más facilidad, por lo que como ya le comentamos, debemos hacer un estudio de cualquier infección presente o residual de tuberculosis, hepatitis B - C y VIH previo al inicio de la terapia.

Para prevenir el riesgo de infecciones es recomendable administrar la vacuna antineumocócica y antigripal.

Durante el tratamiento pueden aparecer infecciones como faringitis, bronquitis, infecciones urinarias, diarreas.

Si usted es una mujer en edad de tener niños, mientras esté en tratamiento y durante los 6 meses posteriores a la última administración no debe quedarse embarazada y debe utilizar un método anticonceptivo seguro.

El paciente debe ponerse en contacto con su reumatólogo o un servicio médico en caso de presentar algún efecto secundario grave o signo de infección (fiebre, malestar general, etc.), en caso de dudas o efecto no esperado.

Declaro que he sido informado adecuadamente sobre el tratamiento con Abatacept. Estoy conforme con la información recibida, he formulado las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas. Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.

Este consentimiento aplica para el tratamiento indicado en la orden médica. Si existe alguna modificación de este por indicación médica, deberé firmar un nuevo consentimiento.

Doy mi **CONSENTIMIENTO** para recibir tratamiento con Abatacept.

\_\_\_\_\_  
Firma del Médico

\_\_\_\_\_  
Firma del Paciente

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal