

Fecha de obtención del CI: _____

Diagnóstico: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____ Rut: _____

Paciente (Primer nombre y dos apellidos): _____ Rut: _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut: _____

Objetivo

El Metotrexato en dosis pequeñas es muy eficaz para el control de la artritis reumatoide, la artritis psoriática, la dermatomiosis, artritis crónica juvenil, etc. En estas enfermedades actúa reduciendo la inflamación articular. En otras enfermedades autoinmunes se utiliza como inmunosupresor para disminuir el requerimiento de uso de corticoides.

Características Principales

Se administra por vía oral, o bien mediante inyecciones intramusculares o subcutáneas una vez por semana. Las dosis oscilan entre 7.5 – 25 mg. semanales.

Debe asociar el uso de comprimidos de ácido fólico a dosis bajas para evitar algunos efectos secundarios que podrían presentarse al tomar dicho medicamento.

Antes de iniciar el tratamiento con Metotrexato es aconsejable disponer de unos análisis de sangre previos y es recomendable realizar una radiografía de tórax.

Durante el tratamiento son necesarios unos análisis de sangre de control para vigilar una posible toxicidad sobre el hígado o sobre la médula ósea.

La ingesta de alcohol está absolutamente prohibida por el riesgo de aumentar una posible toxicidad sobre el hígado,

Cuando sea necesario tratar con antibióticos deben evitarse los que contengan trimetoprim/sulfametoxazol (Cotrimoxazol) por el riesgo de producir interacción con el Metotrexato y aparición de efectos adversos.

Las mujeres en edad fértil deben adoptar medidas de control de la natalidad para evitar el embarazo durante el tratamiento ya que el Metotrexato puede causar malformaciones fetales. En estas pacientes es aconsejable realizar una prueba de embarazo antes de iniciar su uso. En caso que ocurriese un embarazo mientras una mujer esté tomando Metotrexato, debe interrumpir su uso y avisar inmediatamente a su médico tratante. En los hombres que reciben Metotrexato, se aconseja interrumpir al menos tres meses antes de intentar la concepción. Antes de ponerse cualquier vacuna debe comunicarlo al médico. En general, las vacunas con gérmenes muertos o inactivados o vacunas con fragmentos del germen no plantean problemas: gripe, virus hepatitis B, meningococo, neumococo.

Existe peligro con vacunas de gérmenes vivos atenuados, estando contraindicadas la vacuna fiebre amarilla, BCG, tifoidea, polio oral, sarampión, parotiditis, rubéola. La vacuna contra herpes zoster debe ser evaluada en conjunto con su médico.

Riesgos

Frecuentes: Pesadez de estómago, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, diarrea o úlceras en la boca.

Más raros: Cefalea, sensación de inestabilidad, lesiones en piel, coloración amarillenta de la piel, orinas oscuras o pérdida inexplicable de peso.

Infrecuentes: Mayor sensibilidad al sol, caída leve del cabello.

Graves: Leucopenia, anemia, plaquetopenia, sangrado anormal, hematomas, neumonía por hipersensibilidad. Además, si sospecha una infección, fiebre, sensación de falta de aire o una enfermedad importante, debe consultar a su médico sobre la conveniencia de interrumpir temporalmente el medicamento, pues existe mayor riesgo de efectos adversos.

Declaro que he sido informado adecuadamente sobre el tratamiento con Metotrexato. Estoy conforme con la información recibida, he formulado las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas. Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.

Este consentimiento aplica para el tratamiento indicado en la orden médica. Si existe alguna modificación de este por indicación médica, deberé firmar un nuevo consentimiento.

Doy mi **CONSENTIMIENTO** para recibir tratamiento con Metotrexato.

Firma del Médico

Firma del Paciente

Firma del Representante Legal