

Fecha de obtención del CI: \_\_\_\_\_

Hipótesis Diagnóstica: \_\_\_\_\_

Médico (Primer nombre y dos apellidos): \_\_\_\_\_

Paciente: \_\_\_\_\_

Representante legal (si corresponde): \_\_\_\_\_

La "Cirugía Mayor Ambulatoria" (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas.

#### Objetivos

Mediante la litotripsia se pretende fragmentar los cálculos urinarios mediante ondas de choque (energía generada en el litotriptor). Los fragmentos de cálculo resultantes de las ondas de choque, son eliminados en forma espontánea por la orina.

#### Características

Esta técnica constituye actualmente el método ideal - no invasivo - para la eliminación de los cálculos urinarios, debido a su facilidad de aplicación, obviar la indicación de cirugía y menor posibilidad de complicaciones y ser en general, un procedimiento de hospitalización abreviada mínima.

Su inconveniente, es que no se puede garantizar al paciente un 100% de éxito en cuanto a la eliminación de cálculos, haciendo en algunos casos necesaria la repetición del procedimiento, o en definitiva, la intervención quirúrgica.

#### Riesgos

Como toda intervención la litotripsia puede ser causa de algunas complicaciones derivadas del procedimiento mismo o de la anestesia utilizada. El riesgo de complicaciones puede aumentar si concomitantemente usted sufre de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión arterial, neuropatías o cardiopatías crónicas, etc.

Algunas complicaciones posibles propias del procedimiento son:

- Hematuria (sangrado por la orina)
- Dolor o enrojecimiento en la zona de aplicación de las ondas de choque
- Cólico nefrítico como consecuencia de la obstrucción de la vía urinaria por fragmentos de cálculos
- Obstrucción ureteral por fragmentos
- Infección urinaria
- Alteraciones secundarias de la función renal
- En algunas ocasiones puede ser necesaria la hospitalización

Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de **LITOTRIPSIA**.

\_\_\_\_\_  
Firma Médico

\_\_\_\_\_  
Firma Paciente

\_\_\_\_\_  
Firma Representante Legal