

Fecha de obtención del CI: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____

Paciente: _____ Rut: _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut: _____

La "Cirugía Mayor Ambulatoria" (CMA) es aquella en la que se realizan procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad, y en la que el paciente acude al centro de salud el mismo día de la intervención y tras ésta regresa a su domicilio. Es un óptimo modelo de asistencia quirúrgica multidisciplinaria que permite tratar a los pacientes de una forma efectiva, segura y eficiente, con un ingreso inferior a 24 horas.

Objetivos

La intervención que le es propuesta, debido a un aumento del volumen del escroto y/o molestias o dolores locales causados por este tumor benigno, tiene por objetivo retirar el quiste mediante abertura quirúrgica del escroto. En la mayoría de los casos se trata de un quiste único que se desarrolla en relación a la parte engrosada o cabeza del epidídimo, pero pueden existir varios quistes dentro de un mismo epidídimo. La falta de tratamiento le expone al riesgo de aumento de volumen del escroto y a la aparición o recrudescimiento de problemas clínicos.

Características

Se efectúa una pequeña incisión a nivel del escroto, después de verificar el testículo subyacente, se saca el quiste abriendo el envoltorio del epidídimo y se efectúa una disección muy próxima a la pared del quiste. Se cierran sucesivamente las distintas capas después de colocar, eventualmente, un drenaje provisorio.

En los casos pocos comunes de quistes múltiples del epidídimo, el cirujano puede verse forzado a retirar una parte o todo el epidídimo.

Riesgos

Toda intervención quirúrgica conlleva cierto porcentaje de complicaciones y riesgos, incluso vitales, debido a variaciones individuales no siempre previsible. Pueden presentarse:

- Hematoma: hemorragia durante o después del procedimiento puede llegar a causar un hematoma del escroto, eventualmente extendido a los órganos sexuales externos; puede ser necesaria una reintervención para detener la hemorragia y drenar el hematoma.
- Cicatrización lenta, que requiera cuidados de enfermería locales prolongados.
- Infección: la pérdida de líquido por la incisión, síntomas de infección general tales como fiebre o locales como inflamación del escroto pueden requerir el inicio de un tratamiento antibiótico adecuado o el drenaje quirúrgico si se produjera eventualmente un absceso.
- Atrofia testicular: se presenta sólo excepcionalmente después de la cirugía de quiste del epidídimo.

Expreso que este documento me ha sido debidamente explicado y que entiendo todo lo que en él se señala, en tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe en forma ambulatoria el procedimiento de **QUISTE EPIDÍDIMO**.

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Representante Legal