

IAAS

INDICADORES DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD

2021


INTRODUCCIÓN

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS), corresponden a las anteriormente denominadas Infecciones Intrahospitalarias (IIH).

El cambio de nomenclatura se debe a que la prevención y control de estas infecciones no solo incluye a los pacientes hospitalizados sino también a aquellos que son sometidos a procedimientos invasivos en forma ambulatoria.

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) son un problema relevante de salud, cuyas implicancias en morbilidad y costos para el sistema son ampliamente conocidos, requiriendo para su control un conjunto de acciones que abarcan toda la organización hospitalaria, y la incidencia de estas es un indicador de calidad de la atención otorgada.


Neumonía asociada a Ventilación Mecánica(VM) en Unidad de Paciente Crítico Adulto



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.


Neumonía asociada a Ventilación Mecánica(VM) en UPC Neonatal



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departameto de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.


Infecciones de Sitio Quirúrgico asociadas a Cesárea



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.


Endometritis asociada a Cesárea sin Trabajo de Parto



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.


Infecciones de Sitio Operatorio asociadas a Colecistectomía Laparoscópica



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.

Infecciones de Tracto Urinario (ITU) asociadas a Catéter Urinario Permanente (CUP) Médico Quirúrgico



Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde mayo del 2016. Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departameto de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.

(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa de infecciones por debajo de ese valor.

A contar del año 2020 se separa el indicador quedando como pacientes médicos y quirúrgicos.