

Fecha de obtención del CI: _____

Diagnóstico: _____

Médico (Primer nombre y dos apellidos): _____ Rut: _____

Paciente (Primer nombre y dos apellidos): _____ Rut: _____

Representante legal (si corresponde): _____ Rut: _____

Objetivo

El Ácido Zeledrónico 5 mg. (ACLASTA®, DENSIS®), pretende reducir la actividad y las manifestaciones óseas en la enfermedad de Paget y reducir el riesgo de fractura en osteoporosis severa tanto en hombres como mujeres, y en aquellos con factores de riesgo de fractura osteoporótica como son los usuarios de corticoides de manera prolongada.

Características

El ácido Zeledrónico (ACLASTA), es un fármaco de la familia de los Bisfosfonatos, que actúa inhibiendo la fase resortiva del ciclo del recambio óseo. Por esto mejora la calidad ósea en enfermedades como Paget y en la osteoporosis. Se administra por vía intravenosa.

En el caso de la osteoporosis postmenopáusica se administrará una dosis de 5 mg una vez al año que podría repetirse hasta por 5 años. En la enfermedad de Paget se administra una dosis única.

En caso de requerir nuevas dosis, su médico tratante lo determinará en base a su condición y respuesta al medicamento.

Riesgos

En general, suele ser bien tolerado durante su administración.

Está contraindicado en caso de hipersensibilidad a los bisfosfonatos, hipocalcemia, embarazo o lactancia. No se recomienda en caso de insuficiencia renal grave.

En los días posteriores a la administración, puede presentar síntomas, tales como fiebre, dolores musculares, articulares o de cabeza; los que en general desaparecen a los pocos días.

En el caso de los pacientes con enfermedad de Paget, pueden desarrollar hipocalcemia, la que caracteriza por calambres y espasmos musculares, nerviosismo o convulsiones.

Se ha observado osteonecrosis de mandíbula en pacientes tratados con Ácido Zeledrónico. Esta incidencia podría ser mayor en pacientes que han recibido además quimioterapia o glucocorticoides como tratamiento para el cáncer, asociado habitualmente a una mala higiene bucal.

Otras reacciones adversas ocasionales, pueden ser la fibrilación auricular, náuseas, vómitos, diarrea. Menos frecuentes son conjuntivitis, dolor ocular, dolor abdominal, erupción cutánea

Declaro que he sido informado/a adecuadamente sobre el tratamiento con Ácido Zeledrónico. Estoy conforme con la información recibida, he formulado las preguntas que he creído convenientes y me han sido aclaradas todas las dudas planteadas. Sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.

Doy mi **CONSENTIMIENTO** para recibir tratamiento con Ácido Zeledrónico.

Firma del Médico

Firma del Paciente

Firma del Representante Legal